

Agita 10 WG

Control de moscas en instalaciones pecuarias

THIAMETOXAM

100 g / 400 g

Dosis:

Como pintura: 400g/320 mL de agua

Como aspersión: 100g/800mL de agua

Aplicación:

Pintura: en manchas de 10 x 30 cm principalmente donde se encuentran y reposan las plagas.

Aspersión: en lugares donde se necesita amplia cobertura como paredes y techos donde posan las moscas.

Para control de mosca doméstica, mosca de establo, mosca doméstica pequeña, cucarachas y escarabajos. Poder de atracción de 1 metro. Poder residual de hasta 4-6 semanas en aspersión y 6-8 semanas en pintura. Puede aplicarse en presencia de animales.



Composición:

Thiametoxam 10.00%
Equivalente a 100 g de I.A./Kg
(Z)-9 tricosene (atrayente), agente humectante, dispersante y vehículo 90.00%

Indicaciones:

Agita® 10 WG es un insecticida en formulación en gránulos dispersables en agua que contiene el atrayente de moscas z-9 tricosene. Se utiliza para el control de la mosca doméstica (*Musca domestica*), mosca de establo (*Stomoxys calcitrans*), mosca doméstica pequeña (*Fannia canicularis*), cucarachas (*Periplaneta americana*, *Platela germánica*, *Blatta orientalis*) y escarabajos (*Alphitobius diaperinus*) en exteriores e interiores de las instalaciones pecuarias, criaderos, establos, rastros, vados sanitarios, almacenes y áreas de concentración de basura en las instalaciones pecuarias.

Dosis y aplicación:

Aplicar en pintura:

Manchas de 10 x 30 cm

100 g / 80 mL de agua para 40 m²

Aplicar en aspersión:

100 g / 800 mL de agua para 20 m² de piso o 50 m² de pared.

Instrucciones de uso:

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

Agita® 10 WG es un insecticida en formulación en gránulos dispersables en agua que contiene el atrayente de moscas z-9 tricosene. Se utiliza para el control de la mosca doméstica (*Musca domestica*), mosca de establo (*Stomoxys calcitrans*), mosca doméstica pequeña (*Fannia canicularis*), cucarachas (*Periplaneta americana*, *Platela germánica*, *Blatta orientalis*) y escarabajos (*Alphitobius diaperinus*) en exteriores e interiores de las instalaciones pecuarias, criaderos, establos, rastros, vados sanitarios, almacenes y áreas de concentración de basura en las instalaciones pecuarias.

Se puede aplicar como pintura o por aspersión en manchas, en las áreas donde se congregan o reposan las moscas: áreas de pared calientes y soleadas, marcos en puertas y ventanas, postes, pilares, tabiques, afuera de los muros de los comederos, en el exterior de las pipas de leche; así mismo en las grietas y lugares donde se esconden las cucarachas. Cuando la superficie es insuficiente para pintar las manchas o donde no es aceptable una ligera decoloración, la mezcla del Agita® 10 WG puede aplicarse directamente en tiras de cartones, polietileno o tablas ligeras y colgar éstas del techo.

Reg. RSCO-PEC-INAC-0102U-307-032-010.

LEA PREVIAMENTE LAS INSTRUCCIONES, PRODUCTO LIGERAMENTE TOXICO. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

USO VETERINARIO. CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO. LEA LA ETIQUETA ELANCO SALUD ANIMAL, S.A. DE C.V.

Agita® 10 WG como pintura:

Mezcle 400 g de Agita® 10 WG en 320 mL de agua hasta obtener una mezcla homogénea con la que se pueda pintar. 400 g de Agita® 10 WG es suficiente para una construcción con un área de piso de 160 m² o correspondiente a una superficie de pared/techo de 400 m². Se aplica con una brocha común, como si fuese "pintura". Pinte un mínimo de 30 manchas de 10 x 30 cm, principalmente donde se encuentran y congregan las plagas. Se recomienda pintar varias áreas pequeñas y no unas cuantas manchas grandes.

Agita® 10 WG aspersión en manchas:

Llene el aspersor o bomba con 3.20 litros de agua tibia y agregue 400g de Agita® 10 WG. Esta cantidad es suficiente para una construcción con un área de piso de 80 m² o correspondiente a una superficie de pared/techo 200 m². Se debe tratar sólo aproximadamente el 30% de la superficie de pared/techo, es decir de 60 m². Agite bien para asegurar una suspensión apropiada. Aplique en las superficies y lugares dónde las plagas se encuentran o congregan. Vuelva a agitar bien la mezcla antes de reiniciar la aspersión cuando se detuvo por más de 30 minutos.

Utilice la suspensión de Agita® 10 WG el mismo día y de preferencia inmediatamente después de la preparación. No trate paredes sucias o recién lavadas.

El Agita® 10 WG tiene un efecto residual de 4-6 semanas cuando se aplica por aspersión y de 6-8 semanas si se aplica como pintura. La re-aplicación dependerá del grado de infestación.

Precauciones:

Este producto debe aplicarse de acuerdo a las instrucciones y dosis recomendadas. Por su baja toxicidad puede aplicarse en presencia de los animales, cuidando no rociar el producto en los animales, alimento o agua de bebida.

Mantenga el producto apartado de animales y alimentos para animales. El producto debe estar en su envase original, etiquetado, sellado y en un lugar fresco, seco y ventilado.

Precauciones y advertencias de uso:

Utilice equipo de protección adecuado durante el manejo y aplicación del producto: guantes, overol o camisa de manga larga y pantalón largo, protección para ojos y botas. Evite el contacto con la piel y ojos. Después de aplicar el producto, báñese y use ropa limpia.

Precauciones durante el manejo del producto:

No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto. No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes.

Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos.

Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos.

No use el producto sin el equipo de protección adecuado.

No se ingiera, inhale y evite el contacto con los ojos y piel.

No mezcle o prepare el producto con las manos, use guantes, use un trozo de madera u otro material apropiado.

Primeros auxilios:

Retire al paciente de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, mantenerlo en un lugar bien ventilado y proteger que no se enfríe. Si el producto tiene contacto con la piel, retire la ropa contaminada y lavar bien las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón. Si tiene contacto con los ojos, enjuagar los ojos inmediatamente con agua corriente durante varios minutos y procure atención médica inmediata. En caso de ingestión accidental NO induzca el vómito, si el paciente esta consciente administre carbón medicinal con abundante agua. Nunca administrar nada por vía oral a pacientes en estado de inconsciencia.

